


En Chile, su distribución original se extendía desde el río Cachapoal (Región de O'Higgins) hasta Cabo Froward (R. de Magallanes).

El tamaño de su población se ha reducido dramáticamente en un 99% y su distribución geográfica en a lo menos un 50%.




Su principal hábitat son los bosques de lenga y ñirre, pudiendo alcanzar zonas periglaciares y estepas alto andinas.



Es **herbívoro**. Ramonea diversas especies vegetales, destacando las orquídeas, zarzaparrilla, anémona, ciruelillo, hongos y líquenes.

ÁREAS MONITOREADAS POR REWILDING CHILE



HUEMUL

(Hippocamelus bisulcus)

El ciervo más austral y amenazado del continente americano

Aproximadamente 1.500 huemules sobreviven en Chile y Argentina, en pequeñas y fragmentadas poblaciones. Para evitar su extinción, Rewilding Chile en colaboración con el Ministerio de Agricultura, a través de Conaf y SAG, promueven el **Corredor Nacional del Huemul**, una iniciativa que busca **recuperar sus poblaciones y restablecer la conectividad** en áreas claves de conservación. Éste contempla, entre otras acciones, el **primer centro de rescate y rehabilitación de la especie en Chile**.

ESTADO DE CONSERVACIÓN




Registro de Clasificación de Especies Silvestres de Chile (MMA) y en la Lista Roja de la UICN

Es una de las **20 especies** de grandes mamíferos en el mundo **cruciales para la restauración ecológica a gran escala**.



Poseen **pezuñas** y su **pelaje es grueso y denso**. Cuando se acerca el verano o el invierno, se pueden observar manchones por el cambio de pelaje.



Los **machos poseen una mancha negra con forma de "Y" en su cara**. Tienen astas que les crecen desde el primer año de vida y las mudan cada invierno.



Es el **ciervo más grande de Chile**. Mide hasta 80-90 cm de alto a la cruz y pesan entre 60 y 90 kg. Pueden vivir hasta los 12-14 años.

Es uno de los tres ciervos nativos de Chile, junto al pudú y la taruca.

Las hembras se reproducen desde los 3 años aprox. La gestación dura 7 meses. **Sólo tienen una cría por temporada**, la cual recién nacida pesa entre 2-4 kg.

AMENAZAS

La pérdida y fragmentación de hábitat, incendios forestales, especies exóticas invasoras como el ciervo rojo y jabalí, el acoso y ataque por perros (debido a la tenencia irresponsable), además del desplazamiento y las enfermedades transmitidas por el ganado doméstico, entre otras.

